

Informação da escola aos lares

Oxiúros

Agente e transmissão

- O agente é o nematódeo branco *Enterio Vermicularis*, que tem 8-13 mm de comprimento e menos de um milímetro de largura, sendo que ele habita o intestino grosso. O verme apenas parasita humanos, sendo transmitido diretamente de uma pessoa à outra.
- A transmissão é feita pela boca, através dos ovos. As fêmeas migram do intestino grosso em direção ao ânus para colocar seus ovos, especialmente durante a noite.
- Os ovos permanecem viáveis por semanas nos lençóis, por exemplo.
- Os sintomas aparecem de 1 a 2 meses após a infecção.
- Os oxiúros são mais comuns em crianças de 3 a 10 anos, mas a contaminação de crianças mais velhas e de adultos não é rara.

Sintomas

- Coceira na região anal, especialmente durante a noite, podendo atrapalhar o sono e fazer a pessoa urinar na cama.
- O ato de coçar pode causar infecções bacterianas na pele da região anal.
- Pode ocorrer inapetência e irritabilidade.

Tratamento

- Tratamento único com os comprimidos Pyrvi, vendidos sem receita médica na farmácia.
- A higiene das unhas deve ser observada, sendo que as mesmas devem ser cortadas.
- Limpeza das superfícies domésticas.
- As roupas de cama devem ser lavadas ou outros métodos devem ser utilizados, tais como exposição a temperaturas abaixo de zero, para que os ovos sejam destruídos. Os lençóis devem ser trocados.
- O tratamento medicamentoso deve ser repetido em 2 semanas após o primeiro tratamento.
- Recomenda-se que membros familiares assintomáticos também sejam tratados.