

Информация для родителей детей, посещающих школу

Глисты острицы

Возбудитель и пути заражения

- Возбудителем данного гельминтозного заболевания является круглый червь (нематода) *Enterobius vermicularis* белого цвета длиной 8-13 мм и диаметром около миллиметра, который живет в толстом кишечнике. Этот червь паразитирует только на человека и передается от человека к человеку.
- Заражение происходит через рот посредством яиц паразита. Преимущественно по ночам самки червя выползают из толстой кишки к анальному отверстию для откладки яиц.
- Яйца червя, попавшие, например, на постельное белье, сохраняют жизнеспособность неделями.
- С момента заражения до появления симптомов заболевания проходит 1–2 месяца.
- Острицы чаще встречаются у детей в возрасте от 3 до 10 лет, но нередко этим гельминтозом страдают как дети старшего возраста, так и взрослые люди.

Симптомы

- Зуд в области анального отверстия, в особенности по ночам, следствием которого может быть пробуждение среди ночи и ночной энурез (недержание мочи).
- Расчесывание может вызывать бактериальные инфекции кожи в области ануса.
- Возможны отсутствие аппетита и раздражительность.

Лечение

- В аптеке можно приобрести без рецепта препарат Pyrvin, предназначенный для однократного приема.
- Необходимо следить за чистотой ногтей и коротко их стричь.
- Следует поддерживать чистоту в доме.
- Необходима регулярная стирка постельного белья или иные дезинфицирующие мероприятия. Можно, например, выносить белье на мороз для уничтожения яиц глистов. Следует менять постельные принадлежности.
- Прием лекарственного препарата необходимо повторить через 2 недели после первого приема.
- Рекомендуются профилактическое лечение и других членов семьи, у которых не выявлены симптомы гельминтоза.