

Koulun tiedote koteihin

Kihomadot

Aiheuttaja ja tartunta

- Aiheuttaja on 8-13 mm pitkä, vajaan millimetrin levyinen valkea sukkulamato *Enterio Vermicularis*, joka elää paksusuolella. Se on vain ihmisen loinen ja tarttuu suoraan ihmisestä toiseen.
- Tartunta saadaan suun kautta munien välityksellä. Naarasmadot ryömivät paksusuolesta peräaukon seutuun munimaan etenkin öisin.
- Munat pysyvät elossa viikkokausia esim. vuodevaatteissa.
- Tartunnasta on oireiluvaiheeseen 1-2 kuukautta.
- Kihomadot ovat tavallisimpia 3-10-vuotiailla lapsilla, mutta vanhempien lasten ja aikuistenkaan tartunnat eivät ole harvinaisia.

Oireet

- Peräaukon seudun kutina, etenkin yöllä, mikä voi aiheuttaa öistä heräilyä ja yökastelua.
- Raapimisesta voi seurata perianaalialueen ihon bakteeri-infektioita.
- Ruokahaluttomuutta ja ärtyisyyttä voi ilmetä.

Hoito

- Apteekista saatava käsikauppavalmiste Pylvin-tabletit kertahoitona.
- Kynsien kunnosta tulee huolehtia ja pitää kynnet lyhyinä.
- Kodin pintojen puhdistus.
- Vuodevaatteiden pesu tai muu toimenpide esim. pakkaseen vieminen, madon munien tuhoamiseksi. Lakanat vaihdetaan.
- Lääkekuuri tulee uusia 2 viikon kuluttua ensimmäisestä hoidosta.
- Myös oireettomat perheenjäsenet on suotavaa hoitaa.