



Julkinen: Haarasuon pesimälinnustoselvitys 2026

TUPAS-hanke



Euroopan unionin
osarahoittama




Sisällys

1	Johdanto.....	1
2	Menetelmät	3
3	Tulokset.....	4
4	Yhteenveto.....	6
5	Lähteet.....	7

Tekijä: Riku Karjalainen, Luonnontieteiden kandidaatti ja luontokartoittajaopiskelija /
Maastotyöt ja raportointi.
Päiväys: 7.8.2026.
Kansi: Tylli Haarasuon vettyneellä lohkolla 5.
Viittaus: Karjalainen, R. 2026. Haarasuon pesimälinnustoselvitys 2026. Oulun kaupunki.

1 Johdanto

Tämä raportti esittelee Haarasuon pesimälinnustaselvityksen tulokset vuodelta 2026. Haarasuo sijaitsee Sanginjoen ja Koivujoen yhtymäkohdassa, noin 40 kilometrin päässä Oulusta (kartta 1). Haarasuo sijoittuu Ala-Oulujoen valuma-alueella ja se on eteläosastaan Räkäsuon laajan aapasuokokonaisuuden reunustama.



Kartta 1. Haarasuon entisen turvetuotantoalueen sijainti.

Haarasuo oli turvetuotantokäytössä vuodesta 1993 vuoteen 2020 asti. Turvetuotantoalue oli kooltaan noin 166 hehtaaria (kartta 2). Turvetuotanto on päätetty lopettaa alueella vuoden 2023 alussa. Alueen lopputarkastus on tehty elokuussa 2025. Käytön jälkeen osa lohkoista on luontaisesti kasvittunut. Primäärikasvillisuus on pääsääntöisesti tupasvillamättäitä ja märemmillä pinnoilla luhtavillaa (kuva 1). Lohkoille 5 ja 6 on syntynyt jo nykyiseltään kosteikko ja lohko 10–12 ovat vettyneitä.

Tämän selvityksen tavoitteena oli toteuttaa pesimälinnustaselvitys ensimmäistä kertaa Haarasuon entiselle turvetuotantoalueella toiminnan loppumisen jälkeen. Maastotöistä ja raportoinnista vastasi Oulun kaupungin biologiharjoittelija Riku Karjalainen.



**Euroopan unionin
osarahoittama**




Elinvoimakas



OULU





Kartta 2. Haarasuon entinen turvetuotantoalue lohkoittain.



Kuva 1. Haarasuon entisen turvetuotantoalueen kasvittuneiden turvetuotantoaluiden pinta oli tyypillisesti harvojen tupasvillamättäiden peittämä vuonna 2026.



**Euroopan unionin
osarahoittama**



Elinvoimakeskus



OULU




2 Menetelmät

Pesimälinnuston laskenta toteutettiin kahdella käynnillä touko-kesäkuussa (taulukko 1). Selvitysalue rajattiin lohkoihin, jotka olivat vuonna 2026 vettyneitä sekä niiden lähellä sijaitseviin kasvittuneisiin lohkoihin (kartta 3). Suurin osa kasvittuneista lohkoista rajattiin tarkastelun ulkopuolelle. Toukokuun lopussa havainnoidaan suurin osa pesivistä linnuista. Aikaisista pesijöistä sinisorsalla ajankohta on myöhäinen. Myöhemmällä käynnillä kesäkuun alussa suurin osa vesilinnustosta on jo piilettävää, mutta myöhemmät pesijät, kuten osa varpuslinnuista voi olla paremmin havaittavissa.

Taulukko 1. Haarasuon pesimälinnustaselvityksen inventointitiedot.

Selvitysalue	Ajankohta	Aika	Lämpötila	Tuuli	Pilvisyys
Kierros 1: Haarasuo	26.5.2026	3:49 - 8:01	7°C - 8°C	0-1 m/s	0/8 - 4/8
Kierros 2: Haarasuo	9.6.2026	3:52 - 7:01	12°C - 17°C	0-2 m/s	7/8



Kartta 3. Haarasuon pesimälinnustaselvityksen inventointitiedot.



Euroopan unionin
osarahoittama



Elinvoimakeskus



OULU



Laskentamenetelmänä käytettiin sovellettua vesilintujen kiertolaskentaa (Koskimies & Väisänen 1988). Käveltyjen reittien lisäksi lohkoja havainnoitiin laskentapisteiltä kiikareita ja kaukoputkea hyödyntäen.

Pesivien lintujen havaintoyksikkö on pari, ei yksilö. Vesilinnut tulkittiin pesiväksi vesilintulaskennan lajikohtaisen ohjeistuksen mukaisesti. Esimerkiksi telkkäparit tulkitaan juhlapukuisten koiraiden perusteella. Muutoin yksilö tulkittiin pesiväksi, jos se lauloi tai varoitteli pääsääntöisesti selvitysalueen sisäpuolella. Kosteikoille hetkeksi ilmestyneitä ruokailevia tai levähtäviä lintuja ei tulkittu pesiviksi. Ylilentäviä yksilöitä ei huomioitu tuloksissa.

3 Tulokset

Haarasuolla havaittiin yhteensä 19 eri lajia, jotka pesivät tai ruokailivat alueella (taulukko 2). Alueella oli 16 pesivää lintulajia (taulukko 3). Haarasuon parimäärä oli yhteensä 28 paria.

Taulukko 2. Haarasuolla havaitut lintulajit.

Alue	Haarasuo	
Päivämäärä	26.5. (3:49-8:01)	9.6. (4:04-6:58)
Tavi	4	5
Sinisorsa		6
Telkkä	2	1
Metsähanhiryhmä (VU/EN)	2	
Kanahaukka (VU)	1	1
Sinisuohaukka (VU)	1	
Tylli	2	3
Pikkutylli (NT)	2	1
Töyhtöhyppä	1	6
Metsäviklo		1
Valkoviklo (NT)	1	2
Liro (NT)	5	6
Ruokokerttunen (NT)	1	2
Pajusirkku (VU)	1	1
Kiuru (NT)	3	2
Niittykirvinen (RT)	1	1
Keltavästäräkki	2	3
Västäräkki (NT)	5	4

Taulukko 3. Haarasuon pesimälinnusto. Havaintoyksikkö on pari.

Alue	Haarasuo
Tavi	2
Sinisorsa	3
Telkkä	1
Sinisuohaukka (VU)	1
Tylli	1
Pikkutylli (NT)	1
Töyhtöhyppä	3
Metsäviklo	1
Valkoviklo (NT)	1
Liro (NT)	3
Ruokokerttunen (NT)	2
Pajusirkku (VU)	1
Kiuru (NT)	3
Niittykirvinen (RT)	1
Keltavästäräkki	1
Västäräkki (NT)	3



Euroopan unionin
osarahoittama



Elinvoimakeskus



OULU



Alueen pesimälinnusto koostuu kahlaajista, sorsalinnuista ja pensaikeissa sekä pelloilla pesivistä varpuslinnuista. Kaikki vesi- ja rantalinnut pesivät lohkoilla 5 ja 6, jotka muistuttavat jo nykyiseltään kosteikkoja (kuva 3).



Kuva 3. Haarasuon lohko 5. Taustalla lentää metsähanhiryhmän pari, joka pesii todennäköisesti viereisellä Räkäsuon luonnonsuojelualueella.



Kuva 4. Vierailevia tavikoiraita Haarasuon lohkoilla 10.



**Euroopan unionin
osarahoittama**



Elinvoimakeskus



OULU



Alueella havaittiin sinisuohaukka ensimmäisellä käynnillä ja sitä edeltävän ympäristönäytteenoton yhteydessä 18.5.2026 (kuva 4). Sinisuohaukka voi pesiä elinympäristövaatimuksien ja käyttäytymisen perusteella selvitysalueella, mutta arvioon liittyy epävarmuutta. Haarasuolla havaittiin myös saalistavia kanahaukkoja 18.5. sekä molemmalla kierroksilla (kuvat 5). Alueella käy mahdollisesti saalistamassa kahden eri reviirin kanahaukkoja.



Kuvat 4 ja 5. Saalistava sinisuohaukkakoiras ja kanahaukkakoiras saaliin kanssa.

Selvitysalueen ulkopuolelta havaittiin muista huomionarvoisista lajeista järripeippo (NT), palokärki (lintudirektiiviin liite I laji) ja laulujoutsenia (liite I). Alueen ulkopuolella havaittiin muuten ei hallinnollista tilaa omaavia lintulajeja kuten talitiainen, peippo, pajulintu, keltasirkku, harmaasieppo, metsäkirvinen, punarinta, mustarastas, laulurastas, punakylkirastas, hernekerttu, käki, lehtokurppa ja sepelkyhky.

4 Yhteenveto

Tässä selvityksessä Haarasuon entiselle turvetuotantoalueelle tehtiin pesimälinnustoselvitys ensimmäistä kertaa turvetuotannon päättymisen jälkeen. Alueella on nykyiseltään jo vettyneitä pintoja ja kasvillisuusaarekkeitä. Vuonna 2026 alueen pesimälinnustoon kuului kahlaajia, sorsalintuja, pensaikoissa sekä pelloilla pesiviä varpuslintuja ja sinisuohaukka.

Haarasuo tullaan ennallistamaan vuoden 2026 lopusta, minkä myötä alueen pesimälinnuston seuranta on jatkossa tärkeää ennallistamisen onnistumisen todentamiseksi. Haarasuo sijaitsee ekologisesti merkittävälle alueella Räkäsuon aapasuokokonaisuuden lähellä, mikä korostaa ennallistamisen merkitystä onnistuessaan.



**Euroopan unionin
osarahoittama**



Elinvoimakeskus



OULU



5 Lähteet

Hyvärinen, E., Juslén, A., Kemppainen, E., Uddström, A. & Liukko, U.-M. (toim.) 2019. Suomen lajien uhanalaisuus – Punainen kirja 2019. Ympäristöministeriö.

Koskimies, P. & Väisänen, RA, 1988. Linnustonseurannan havainnointiohjeet. – Helsingin yliopiston eläinmuseo, Helsinki. 143 s.



Euroopan unionin
osarahoittama



Elinvoimakeskus



OULU



